

短喙象类化石在陝西的新发现

薛 祥 照

(西北大学地质系)

短喙象类亚科 (Brevirostrinae) 以其短的头骨, 和现代象类一样收缩变短的上下颌, 颚齿唇舌两侧的齿锥交错排列, 琥珀质程度不等的褶曲等等为主要特征, 区别于其他类型。亚科内现已知的有三个属: *Anancus*, *Synconolophus*, *Pentalophodon*。我国发现的这类化石还不多, 只有前两属在山西、甘肃、四川曾有较可靠的记载。

本文主要是记述在陕西省邠县、白水两地发现的短喙象类的两个新种化石。一种是 *Anancus paisuyensis* sp. nov.; 另一为 *Pentalophodon simplex* sp. nov.。后者是 *Pentalophodon* 属在中国的首次发现。

Anancus paisuyensis, 以一对上第三臼齿及半个颊齿为代表, 是 1959 年西北大学地质系部分师生(作者在内)到白水观察新生代地层剖面时, 在西白公路旁红色砂质粘土层中发现的。该地区出露的含化石层的地层厚度不大, 其上下关系及岩性自上而下为:

第四系: 底部砂砾石层, 砂层, 其中含有鹿及其他哺乳类化石。

~~~~~ 不整合 ~~~~

第三系:

3. 砂质粘土、亚粘土层: 紫红色, 靠下部砂质较多。中部质较细腻, 致密坚硬, 产象牙化石, 靠上部质又变粗, 含有少量半浑圆的砾石或钙质结核。
2. 砂(岩)层: 粉红棕黄色。以较均匀的粗粒石英为主, 钙质泥质胶结, 较紧密坚硬, 局部有由小钙质结核形成的砾石透镜体, 都有黑色锰质的网状染色。
1. 砾石(岩)层: 灰棕红色。砾石成分以灰岩、杂色页岩、砂岩为主, 砾石直径一般在 2—3 厘米之间, 半浑圆, 分选不好。砂泥质及红色粘土胶结, 较疏松。

~~~~~ 不整合 ~~~~

二迭系: 杂色砂页岩, 产状为倾向 S20°E ∠15°

白水的 *Anancus* 化石与过去在山西、甘肃发现的两个种有显著区别(见后), 是这一属的一新种。结合地层上下层位、岩性及化石特征, 产化石的红色砂质粘土层的时代为上新世早期。

Pentalophodon simplex 由一个带部分下颌骨的左下第三臼齿为代表, 由黄河勘查设计院第三分院送交鉴定的, 发现于邠县大佛寺水坝左山坡上, 灰白色半胶结的砂砾石层底部。其剖面自上而下为(依送标本单位的资料):

第四系: 砂砾石层, 厚约 10 米。上部为黄土夹红色粘土条带, 厚约 2 米。

~~~~~ 不整合 ~~~~

第三系：下部为半胶結的砾岩，中部为紫紅色粘土，上部为半胶結灰白色砂砾岩，共厚約 32 米，化石即采自本层上部。

~~~~~ 不整合 ~~~~

白堊系：紫紅色长石石英砂岩、砂岩及砾岩的互层，共厚約 15 米。

邠县的化石呈灰白色，上有水冲洗的痕迹，可能稍經搬运。本属化石主要分布于更新世初期。含化石的“半胶結的灰白色砂砾石层”又可与邻近地区的更新統底部堆积相比，因此該地层很可能是下更新統的底部（或上新統頂部）而非象黃河勘察設計院認為的籠統的“第三系”。

化 石 描 述

科 **Gomphotheriidae** (=Palaeomastodontidae)

属 **Anancus Aymard 1855**

***Anancus paisuyensis* sp. nov. (新种)**

材料：完整的右上第三臼齿 (M^3) 一个，(正型标本)。西北大学地質系古哺乳类編号 (以下同) M. 59.1；部分牙根被损坏的左上第三臼齿一个，編号 M. 59.2；半个上頬齿，編号 M. 59.3。

产地：陝西白水，南河乡南一公里西白公路西侧。

时代：上新世早期。

种的特征：牙齿大， M^3 之牙脊式为 $6\frac{1}{2}$ ，主齿柱 (pretrite) 和副齿柱 (post-trite) 在前四个牙脊显著地交错排列，在后二牙脊上则相连成“V”形，所有齿錐 (cone) 除副齿柱侧的第一、二个外，都以較大角度斜交于牙之长軸，主齿柱的齿錐比副齿柱的要寬大，牙前端之齿带发育成副壁 (butress)，脊谷沟口往往有副小尖存在，白堊质层較发育。

标本描述：三个标本中，以 M. 59.1 (M^3) 保存最完好，現以其为代表描述如下 (图版 I 图 1, 2)：

牙大，冠高中等，有六个牙脊及一个小齿跟 (talon)，

牙齿測量 (毫米)：

| | |
|-----------------|-----|
| 牙全長 (L.) | 220 |
| 牙寬 (W.) (第三牙脊处) | 98 |
| 冠高 (H.) (第三牙脊处) | 70 |

牙冠由前向后高度逐渐減低，构造形状逐渐变得简单，各牙脊都由二个齿錐組成，在上牙舌側者称主齿柱，靠唇側者称副齿柱（下牙的恰与此相反），主齿柱各尖錐都由显著或不太显著分裂的 2—3 个乳瘤 (conule) 組成。由前向后第一齿錐刚被磨用露出齿質，其冠面珐瑯質层围成向前凸的“腰子形”花紋，第二齿錐由三个乳瘤組成，与牙之长軸約呈 45° 斜交。在第三尖靠内部突起的乳瘤內侧前后，又明显的分出两个小瘤，因而使主齿柱在此显得較肥厚，第四齿錐由显著分裂的两个乳瘤組成，白堊質充填于其間之裂縫内。第五齿錐也由二乳瘤組成，內面的一个又分出一个位置較低矮的瘤尖，其与第四齿錐之間的脊谷

較深寬，第六齒錐的兩個乳瘤大小相近。從第二到第六尖基本上相互平行排列，都向前傾斜與牙之長軸斜交，而第一齒錐則以相反方向斜交。

副齒柱各齒錐稍小於與之相對的主齒柱側的齒錐，錐頂分裂不顯著，由前向後第一個齒錐也稍被磨用，琺瑯質層構成一後面凹陷的“U”形花紋，第二齒錐比其他的要高大，前壁陡峻，脊谷深寬，其外側的乳瘤較內側的大，與第三齒錐一起正交於牙之長軸，向後各齒錐逐漸變低，變窄小，錐頂分裂更不顯著，脊谷深而兩谷壁陡。第四、第五齒錐向前和牙之長軸呈約55°斜交，和主齒柱側與它相對的齒錐不呈交錯排列，而是相連呈尖端指向前的“V”形弧。第六齒錐圓，位置比其他的更低，被一淺裂紋分成兩個乳瘤，與牙之長軸正交，和主齒柱的對應齒錐相連成一寬緩的圓弧形。

前二牙脊的齒錐顯示三葉形圖形(trifoliate)。

牙前端齒帶(cingulum)很發育，呈壁狀橫列於第一牙脊之前。第一脊谷的唇舌兩側及第四脊谷的舌側各有一副小尖。

跟座小，位置低矮，稍偏唇側，緊接在第六牙脊之後成一低台，由二個大小相似的圓形尖瘤組成。

整個牙齒的琺瑯質層外壁較粗糙。白堊質中等發育。

討論與比較：*Anancus* 在中國只有在1935、1937年有胡步伍德(Hopwood)、德日進及湯道平(Teilhard and Trassaert)先後研究並訂名的兩個種：*A. sinensis* (Hopwood)，*A. cuneatus* (Teilhard and Trassaert)，存有標本都來自或可能來自山西東南部榆社盆地的上新統底部。1948年楊鍾健、劉東生先生又報導了一個甘肅的*A. sinensis* 上臼齒。

胡步伍德和德日進等最初都將標本訂為*Pentalophodon* 屬，當1935年胡步伍德的*P. sinensis* Hopwood 一名訂定後，同年奧斯朋(Osborn)即提出該標本確屬短喙象類，但其牙脊，不是*Pentalophodon* 所應有的 $M2 \div 5$ 個， $M3 \div 6\frac{1}{2}^+$ 個，而是 $M2 \div 4$ 個， $M3 \div 5-6$ 個，同時 M^3 的尖瘤都很分離，而傾向於把它放入同一亞科的另一屬*Anancus* 中，將原名修訂為*A. sinensis* (Hopwood)。作者根據奧斯朋歸納的短喙象類三個屬的主要區別，將胡步伍德的原標本照片與*Anancus* 屬和*Pentalophodon* 屬各種(目前收集到的)的對比，認為奧斯朋的修改是正確的。不過，奧斯朋的修改似乎主要是根據頰齒的牙脊數，關於這一點並不是十分固定的，就在奧氏後來的歸納中也提到*Anancus* 的牙脊數：
 $M2 - \frac{4-4\frac{1}{2}}{4-4\frac{1}{2}}$, $M3 - \frac{5\frac{1}{2}-5\frac{1}{2}^+}{5\frac{1}{2}-6\frac{1}{2}}$, *Pentalophodon*: $M2 - \frac{5}{5}$, $M3 - \frac{? - 7\frac{1}{2}}{6\frac{1}{2}-7\frac{1}{2}}$ ，可以看出這類象頰齒的特別是第三臼齒的牙脊數是可以有一定的變動範圍的。此外，二屬的主要區別還在於前者牙脊的齒錐分裂較多，一般每個牙脊由四個乳瘤組成，有或顯或不顯著的內、外三葉形圖案，琺瑯質層稍有褶曲，而後者牙齒上的尖、乳瘤或中間小尖數目都很少，一般每個牙脊只由三個高陡的乳瘤組成，無內、外三葉形圖案，琺瑯質層光滑。

維來(Viret, J.)在他的1952年的文章中討論到中國的*A. sinensis* 不是*Pentalophodon* 屬，亦不是*Anancus* 屬，而是*Synconolophus*。在短喙象的三個屬中，*Synconolophus* 具有易於與另二屬分開的特點，首先其牙脊數 $M^2 - \underline{3\frac{1}{2}^+}$, $M3 - \frac{4\frac{1}{2}-5\frac{1}{2}}{? - 5\frac{1}{2}}$ ，比前二者的要少。其次，也是最顯著的，是其頰齒齒脊上的齒錐強烈地分裂，由原來的具有三葉形圖案的齒錐分離出去的各個分開的中間小尖很多，甚至有的一個牙齒上就有40—41個獨立的尖瘤。

(而 *A.* 和 *P.* 的一般只有 20—30 个), 这些尖瘤排列較不規則, 緊擠, 琥珀質層強烈褶皺捲曲, 磨蝕後呈多角形、圓三角形、或圓形圈, 純人一“迷亂”的印象。而前人鑑定為 *Pentalophodon sinensis* (即後來修訂的 *A. sinensis*) 的原始標本雖然其牙齒的第一、二牙脊後面具中間小尖, 齒錐分裂較多, 但向後去, 牙齒的結構愈簡單, 小尖、尖瘤等都減少, 幾無 *Synconolophus* 的特點, 故不能歸於 *Synconolophus* 屬。至於是否在 *A. sinensis* 同時發現和收集到的其他標本中有屬於 *Synconolophus* 者, 尚待今後系統的整理和進一步研究。

此外, 德日進和湯道平(1937)研究定名的 *Pentalophodon cuneatus* 新種, 周明鎮、張玉萍在他們的“華北乳齒象類的新材料”一文中訂正為 *A. cuneatus* (Teilhard and Trashaert), 原標本 M^3 5 個牙脊, 每一脊由兩個各包含二乳瘤的齒錐組成, 前二牙脊的齒錐略具三葉形圖案, 其他的小尖瘤較多, 這些都是 *Anancus* 屬的特徵, 將其歸於 *Anancus* 屬內也是正確的。

陝西白水的標本中, 虽未採到 M^2 , 无法得知其牙脊數, 但就 M^3 看, 具有 $6\frac{1}{2}$ 個牙脊, 成各齒錐的乳瘤遠不如 *Synconolophus* 的多, 但又比 *Pentalophodon* 的要複雜, 前二牙脊的齒錐具三葉式圖案, 琥珀質層外壁較粗糙, 屬於 *Anancus* 無疑。

白水的標本與 *A. sinensis* 相比, 除屬的共同特徵外, 二者的主齒柱均與牙之長軸斜交, 前端齒帶發育, 脊谷缺口有小副尖。但 *A. sinensis* 的第三上臼齒比白水的要短小(見下大小對比表), 其主、副齒柱由前到後明顯的交錯排列, 兩側齒錐的大小相若, 副齒柱的齒錐與牙齒長軸的正交。故二者的差別很顯著。

再與 *A. cuneatus* 相比, 後者的主、副齒柱不呈明顯的交錯排列, 而是兩邊相連成尖端指向前的“V”形脊, 各牙脊的兩個齒錐都由大小相近的兩個乳瘤組成, 牙冠被豐富的白堊質所包裹。顯然二者的區別也很大, 不是同一種。

白水標本與另二種之大小對比(毫米)

| 名 称 | 牙 长 (L.) | 牙 宽 (W.) | 牙 冠 高 (H.) | 牙 长 宽 序 数 |
|--------------------------------|----------|----------|------------|-----------|
| <i>A. sinensis</i> (M^3) | 216 | 93(第三脊) | 66(第三脊) | 42.7 |
| <i>A. cuneatus</i> (M^3) | 208 | 84(第三脊) | 57(第四脊) | 41.8 |
| <i>A. paisuensis</i> (M^3) | 220 | 98(第三脊) | 70(第三脊) | 44.1 |

根據上述特點及對比, 白水的標本與前人研究的有顯著的區別, 應為一新種。

前人研究時認為 *A. cuneatus* 的牙齒具有豐富的白堊質, 後端牙脊主、副齒柱之齒錐相連成“V”形, 是比 *A. sinensis* 進步的種類。白水的標本, 前數牙脊之主、副齒柱顯著地交錯排列, 齒錐分裂較厲害, 构造較複雜, 與“較原始”的 *A. sinensis* 特徵相似。但其後端牙脊排成“V”形, 白堊質較 *A. sinensis* 的要多, 這些又與“較進步”的 *A. cuneatus* 相似, 白水的標本似乎兼具“較進步”和“較原始”的特徵, 很可能是介於前二者之間的一個種類。

標本 M. 59.2 為一左上第三臼齒(圖版 II, 圖 1), 按其大小、特徵、保存情況看與 M. 59.1 的完全相同, 二者應為同一個體的左右牙齒。M. 59.3 因標本破損較厲害, 未能提供較多的對比研究條件, 但因與上二標本在同一地點相同的層位發現, 故暫歸入此類。

*Pentalophodon Falconer, 1857**Pentalophodon simplex* sp. nov. (新种)

材料：一个带有部分下颌骨的左下第三臼齿，编号 M. 62.1 (图版 II, 图 2) (据送标本的同志说，此牙床上原有两个牙齿，前面一个被遗失)。

产地：陝西邠县大佛寺水坝左山坡上。

时代：更新世早期(或上新世晚期)。

种的特征：牙齿窄长，脊谷深宽，组成主齿的齿锥除第一、二个分裂为两个乳瘤外，其余的全为单个，前四脊的主、副齿柱交错排列，第五牙脊(及以后的?)的连成“V”形，珐琅质光滑无小结节，白垩质丰富。

标本描述：颌骨为接近上升枝处的一段，其前后端及下方都被破损。

牙齿有五个交错排列的横脊，第五个牙脊以后的部分被断失，牙之前内侧角亦稍受损坏。牙齿窄长，向唇侧弯曲。第一个牙脊稍受磨损，从牙脊的形状、结构看，推想第五脊之后可能还有一个牙脊和后跟，牙齿应为 M_3 。

前四个牙脊之主、副齿柱相互交错排列，主齿柱的齿锥斜错于副齿柱的之后，由前向后，第一齿锥由二个内小外大的乳瘤组成，向后倾斜与牙之长轴相交，第二齿锥与后内方有一附小尖，从第三齿锥起向后各齿锥不分裂，仅由单一的呈圆锥柱状的乳瘤组成，并递次变小。副齿柱的各尖都由两个大小相近的乳瘤组成，从第四齿锥起往后，各锥顶上的裂缝不如前面的深和显著。第一齿锥之后内方有一小瘤，与主齿柱的第一齿锥一起，使第一牙脊构造显得较为复杂。

主、副齿柱各齿锥都以不同角度斜交于齿长轴，副齿柱各齿锥愈往后斜交的角度愈大。

前四个牙脊之主齿柱斜错于副齿柱的齿锥之后，而在第五牙脊上，二者相成一尖端指向前面的“V”形脊，推想断失的那一部分与第五脊构造相同。

牙前端之齿带发育成副壁状，主要位于主齿柱第一齿锥之前方。在第一脊谷舌侧沟口有一副尖，其余各边无齿带发育。脊谷深宽，一般宽 7—10 毫米。丰富的白垩质包裹各尖锥，并满脊谷底(部分可能因受水冲刷，未能全部保存，只见其遗迹)。

牙齿大小测量 (毫米)

| | | |
|----------|-------------|-----------|
| 牙 长 (L.) | 160 (第一—五脊) | |
| 牙 宽 (W.) | 68 (第三脊处) | 62 (第五脊处) |

讨论与比较：邠县的标本，根据上述的牙脊数，组成脊上各齿锥的分裂情况及乳瘤数目等等特征，确属 *Pentalophodon* 属。1935、1937 年分别由胡步伍德和德日进及湯道平定名的两种如上文述及已经修改，因此，陝西邠县的材料应算 *Pentalophodon* 在我国的首次发现。

邠县的标本与牙较宽大、牙脊排列紧挤、各齿锥分裂厉害、中間乳瘤大为主要特征的

印度的 *P. falconeri* Osborn 区分。与印度的 *P. sivalensis* Cautley 有较多的相似点，二者大小相近，后者的牙也较窄长，脊谷宽，乳瘤少且小，但其齿锥由前向后都显著地分裂，在二乳瘤之间的珐琅质层生有许多小结节，无白垩质，显然不是一种。

又按标本尖锥的多少、排列、和白垩质的多少，本新种很可能是本属中一个较进步的种类。

本文得导师周明镇教授的指导并校阅原稿、王哲夫先生及袁习琴同志照象，作者表示衷心的感谢。

参 考 文 献

- Chow, M. and Chang Y. 1961: New Mastodonts from North China. Vert. Palasiatica. 5(13), 245—255.
 Hopwood, A. T. 1935: Fossil Proboscidea from China. Pal. Sin. Ser. C, 9(3).
 Osborn, H. F. 1936: Proboscidea, Voll. 1. New York.
 Teilhard de Chardin P. and Trassaert M. 1937: The Proboscidians of South-Eastern Shansi. Pal. Sin. Ser. C, 8(1).
 Vaufrey, R. 1958: Proboscidea, étude systématique. in Piveteau: Traité de Paleontologie. 6(2), 203—295.
 Viret, J. 1953: Observations sur quelques dents de Mastodontes de Turquie et de Chine. Ann. Univ. Lyon, Sec. C, fasc. 7.
 Watson, M. S. 1946: The Evolution of the Proboscidea. Biol. Rev. 21.
 Young, C. C. and Liu, P. T. S. 1948: Notes on a Mammalian Collection Probably from the Yüshe Series (Pliocene). Contrib. Inst. Geol. Academia Sin. No. 8, 273—291.

NOTES ON TWO NEW BREVIROSTRINE MASTODONTS FROM SHENSI

Hsieh Hsiang-hsu

(Department of Geology, Northwestern University, Sian)

(Summary)

Two new species of brevirostrine mastodonts are described in this paper. Both are represented by well preserved molars collected by members of Dept. of Geology, Northwestern University, from the province of Shensi.

Gomphotheriidae (=Palaeomastodontidae)

Anancus Aymard 1855.

Anancus paisuyensis sp. nov.

Material: Type—Right and left upper third molar (M 59.1; M 59.2); Referred specimen—a molar fragment (M 59.3).

Locality and Horizon: Nan-ho Village, Pai-Sui-Hsian, Shensi; Lower Pliocene red clays.

Specific characters: Third upper molar larger than that of the others, crown moderately high, with six ridges and a talon. Each ridge consists of two main cones

which in the successive ridges decrease gradually in height and complexity from front to back. Each main cone consists of 2—3 conules. All the cones of pretrite are wider than those of the post-trites. The anterior four ridges have the cones of both sides arranged in altering series, and in the posterior two ridges they are chevron-shaped. All the main cones, except the first and second of the post-trite, are oblique to the long axis of the tooth. Anterior cingulum developed into buttress. The entrances of the first valley and the lingual entrance of the fourth are blocked by accessory conules. Cement abundantly present on the bottom and walls of the transvers valleys.

Pentalophodon Falconer, 1857

***Pentalophodon simplex* sp. nov.**

Material: A lower left third molar with partial mandible (M 62.1).

Locality and Horizon: Da-fou-sche of Pien-Hsien, Shensi; lower Pleistocene or uppermost Pliocene white-grayish sandy conglomeratic beds.


Specific characters: Both the jaw and tooth are broken at the posterior, the latter has five fully developed transverse ridges well preserved. According to the size and structure there might be a sixth ridge and a hind talonid which had been lost in our specimen.

The tooth is long and narrow, with alternating arranged pretrites and post-trites. Each pretrite, except the first one, is composed of a single conical cone. The last two are progressively smaller. The cones of post-trite consists of two conules of equal strength, but in the posterior ridges the summits of the cones are not distinctly divided.

The cones of pretrite are slightly oblique to the long axis of tooth and those of post-trite are strongly-oblique.

The first ridge is composed of four conules, so that it appears to be more complex in structure. In the fifth ridge, the pretrite and post-trite are in connection with each other to form a chevron. To be sure, the broken hinder ones are of the same construction. Buttress well developed and there is a accessory conule on the lingual side of the entrance of the first vally. Cement abundant.

Remarks: Hopwood (1935) and Teilhard de Chardin and Trassaert (1937) had described two species of brevirostrine mastodonts under the generic name *Pentalophodon* (*P. sinensis* and *P. cuneatus*). Later they were correctly transferred to the genus *Anancus* by Osborn (1935) and this was adapted by Chow and Chang (1961). According to the opinion of Viret (1953) *Pentalophodon sinensis* Hopwood might belong to the genus *Synconolophus*. This seems to be not likely in the opinion of the present author.



Anancus paisuyensis sp. nov.

图1. 右上第三臼齿 (M^3), (M. 59.1), 冠面观, $\times 1/2$ 。
图2. 右上第三臼齿 (M^3), (M. 59.1), 舌侧观, $\times 1/2$ 。




图 1. *Anancus paisuyensis* sp. nov.
左上第三臼齿 (^3M), (M. 59.2), 冠面观, $\times 1/2$ 。

图 2. *Pentalophodon simplex* sp. nov.
左下颌骨附第三臼齿 (^3M), (M. 62.1), 冠面观, $\times 1/2$ 。